


1 aleta dorsal



Sábalo

Alosa alosa (Linnaeus, 1758) (420)
Clupeidae

Tamaño
50-60 cm
(70 cm)



Profundidad
5-30 m
(0-50 m)

Criterios de distinción: (1) 1 mancha oscura (raramente 2 o 3) detrás del opérculo. (2) Boca que acaba por detrás de la pupila.

Descripción complementaria: Cuerpo más elevado y cabeza menos apuntada que la sardina. Sin radios más largos en la a. anal. Escamas pequeñas. Escutelos (escamas con punta prominente) que forman una carena ventral marcada. A. pélvicas insertas justo detrás del origen de la a. dorsal. Dorso azul oscuro; flancos y vientre blanco plateados.

Modo de vida: Pez gregario, que remonta los ríos en primavera para reproducirse, a veces 600-700 km. Especie ocasional.

Especies próximas: Restringidas al Mar Negro, el sábalo del Mar Negro *Alosa caspia* (Eichwald, 1838), y el sábalo pónico *Alosa pontica* (Eichwald, 1838), tienen también una mancha detrás del opérculo. Sólo pueden distinguirse examinando las espinas filtrantes de los arcos branquiales (branquiospinas).



Saboga

Alosa fallax (Lacépède, 1803) (= *Alosa finta*) (420)
Clupeidae

Tamaño
45-50 cm
(55 cm)

Profundidad
5-30 m
(0-250 m)



Criterios de distinción: (1) 1 mancha negra detrás del opérculo, seguida de 5-7 manchas gris oscuro. (2) La boca acaba por detrás de la pupila.

Descripción complementaria: Cabeza ligeramente más apuntada que en el sábalo. Sin radios más largos en la a. anal. Escamas más bien grandes. Escutelos (escamas con puntas prominentes) formando una carena ventral marcada. A. pélvicas insertas detrás del origen de la a. dorsal. Dorso en general azul brillante; flancos y vientre blanco plateados.

Modo de vida: Pez gregario, migrador, que remonta los estuarios en primavera para reproducirse. Especie ocasional.

Confusiones posibles: Principalmente con el sábalo (v. especie anterior), de la que sólo puede diferenciarse examinando las branquiospinas.

Especies próximas: Los científicos reconocen hasta 4 subespecies de saboga (indistinguibles in situ).



Boquerón

Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) (426)
Engraulidae

Tamaño
15-17 cm
(20 cm)

Profundidad
2-50 m
(0-250 m)

Criterios de distinción: (1) Hocico cónico, muy prominente. (2) Gran boca hendida, muy por detrás de los ojos.

Descripción complementaria: Cuerpo muy esbelto, más cilíndrico que la sardina. Ojos muy adelantados. Sin carena ventral (sin escamas modificadas). Dorso verdiazul estando vivo, flancos plateados, vientre blanco. A menudo una banda longitudinal plateada con una línea oscura por encima.

Modo de vida: Pez gregario más bien costero, a menudo migrador (pero ciertas poblaciones son sedentarias), que soporta las aguas poco saladas de estuarios y lagunas litorales. Especie ocasional en la costa.

Aproximación: Se observa más raramente y es más difícil acercarse que a la sardina, hasta el punto de que a menudo quedan dudas en cuanto a su identificación.

Confusiones posibles: En inmersión, sobre todo con la sardina (p. 27).

