

Hendiduras branquiales por debajo



Noriega

Dipturus batis (Linnaeus, 1758)
(= *Raja batris*) (425) - Rajidae

Tamaño
1,2-1,5 m
(2,85 m)


Profundidad
100-200 m
(30-600 m)

Criterios de distinción: (1) Hocico largo y apuntado. (2) Cara ventral grisácea, con numerosos puntos negros. (3) Presencia de espinas entre las dos aletas dorsales.

Descripción complementaria: Borde anterior de las alas muy cóncavo. 12-18 espinas centrales en la cola. Dorso de pardo a gris oliváceo, a menudo con puntos claros y manchas oscuras difusas; a veces 2 manchas ovales que recuerdan ocelos difuminados en los jóvenes.

Modo de vida: Más bien en fondos arenoso-limosos. Sólo los jóvenes se encuentran a profundidades accesibles a los submarinistas.

Especies próximas: *Dipturus nidrosiensis* (Storm, 1881) es pardo oscuro, el vientre cubierto por un mucus negro. *D. linteus* (Fries, 1838) tiene el vientre blanco, con el margen gris y una mancha a cada lado del ano. Ambas especies son nórdicas y de aguas profundas.




Picón


Dipturus oxyrinchus (Linnaeus, 1758) (425) (= *Raja oxyrinchus*) - Rajidae

Especie principalmente de aguas profundas. (1) Hocico formando un rostro muy alargado. (2) Cara ventral oscura, con numerosos puntos negros. (3) Sin espinas entre las dos aletas dorsales. Lados del disco muy cóncavos, borde anterior de las alas casi a 90 grados del eje del cuerpo. 4-

11 espinas centrales en la cola. Dorso de gris a pardo oscuro, más o menos jaspeado, a menudo con marcas claras y puntos negros indefinidos. **Tamaño:** 1,2-1,3 m (1,5 m). **Prof.:** 90-1000 m (50 m para los jóvenes). Más bien en fondos arenoso-limosos. Atlántico, desde el norte de Noruega a Mauritania, Mediterráneo (en aguas profundas).



△ Picón macho (pescado).



Raya cardadora

Leucoraja fullonica (Linnaeus, 1758)
(= *Raja fullonica*) (429) - Rajidae

Tamaño
0,9-1 m
(1,15 m)

Profundidad
100-400 m
(30-600 m)

Criterios de distinción: (1) Bordes anteriores del cuerpo casi rectos. (2) Estrías transversales claras y oscuras, que convergen hacia los ápices de las a. pectorales (jóvenes sobre todo). (3) 2 filas de espinas en la cola (adulto).

Descripción complementaria: Disco de forma romboidal. Cara superior rugosa (dentículos cutáneos). 1.ª y 2.ª a. dorsal muy próximas. Tonalidad de fondo gris pardo; vientre azulado, sin manchas negras.

Modo de vida: Esta raya frecuente sobre todo los medios limosos y arenoso-limosos profundos. Prefiere las aguas frescas y vive a mayor profundidad en las regiones meridionales; en cambio, puede acercarse a la costa en verano en las regiones más nórdicas.

